



流行性乙型脑炎

我国主要分布在东北、华北、华南等地区，潜伏期10~15天。表现为高热、头痛、恶心、呕吐、嗜睡、重者抽搐、昏迷、甚至呼吸衰竭至死。多发于儿童，死亡率较高。



疟疾

主要分布长江流域、江南地区，潜伏期10~20天。表现为：寒战、高热、出汗、贫血和脾肿大。恶性疟疾侵犯内脏。



蚊子传播的疾病



登革热和登革出血热

由登革病毒引起，经蚊传播的急性传染病。登革热以发热，皮疹，肌肉和骨关节剧烈酸痛，淋巴结肿大，白细胞减少等为主要表现，病死率低；登革出血热以发热，皮疹，出血，休克等为主要特征，病死率高。目前主要分布在我国南方沿海地区，长江以南为多。



丝虫病与黑热病

丝虫病通过蚊虫叮咬而传播，在我国仅有斑氏及巴来丝虫病流行，长江以南地区流行。丝虫寄生在淋巴组织，皮下组织或浆膜腔，引起淋巴管炎症及阻塞，形成象皮肿，腹水等。临床还有丝虫热，肺部嗜酸粒细胞浸润综合征等。黑热病：是由白蛉叮咬而传播的，为内脏利什曼原虫引起的地方性传染病。